TRATTAMENTO ANTALGICO PERCUTANEO NELE PATOLOGIE DEL RACHIDE

Peter Azriel Davidovits
Ruggero Monari

METODICHE ANTALGICHE PERCUTANE

- **INFILTRAZIONE PERIDURALE**
- **INFILTRAZIONE RADICOLARE**
- **INFILTRAZIONE DELLE FACCETTE ARTICOLARI**
- **BLOCCO DELLA RADICE NERVOSA**
- **VERTEBROPLASTICA**
- **OZONOTERAPIA**

IMPORTANTE!

Prima di ogni trattamento antalgico specifico è indispensabile:

- **Scrupolosa valutazione clinica**
- **Esame obiettivo**
- **Attenta considerazione degli esami diagnostici**

ESAME CLINICO

- Storia ed evoluzione della patologia
- Localizzazione del dolore, irradiazioni, contratture, parestesie, paresi, valutazione dei riflessi
- Test (innalzamento dell'arto esteso, Lasegue)

ESAME OBIETTIVO

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
IN PRESENZA DI
LOMBALGIA

RADIOLOGIA TRADIZIONALE

RISONANZA MAGNETICA

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA

SCINTIGRAFIA OSSEA

CENNI ANATOMICI

Fig. 27.11 A Anatomia.

(1) Midollo spinale, (2) dura madre, (3) cauda equina,
(4) legamento flavo, (5) spazio epidurale, (6) spazio subaracnoide

- Sezione sul piano sagittale da D11 al coccige

CENNI ANATOMICI

- Immagine di una vertebra lombare sul piano assiale

PROCEDURA

- Tutte queste metodiche d'infiltrazione devono avvenire preferibilmente sotto guida TC

L'INFILTRAZIONE PERIDURALE

- Con l'infiltrazione peridurale selettiva è possibile somministrare farmaci analgesici, anestetici e antinfiammatori a ridosso della sede da cui nasce il dolore, farmaci che agiscono in maggior percentuale localmente.

L'INFILTRAZIONE PERIDURALE

- A livello lombare si accede allo spazio epidurale attraversando la cute, la sottocute, la fascia muscolare e il legamento giallo.
- Lo spazio epidurale contiene solo grasso e plessi venosi.

COMPOSIZIONE FARMACI

Si procede previa anestesia locale di lidocaina, con ago spinale e con:

- Depomedrol 40 mg
- Lidocaina 0,20 mg
- Mezzo di contrasto 3 mg

L'INFILTRAZIONE PERIDURALE

- La zona d'azione dei farmaci iniettati in sede epidurale è la parte in cui la radice spinale esce dai forami intervertebrali seguendo la guaina durale
- Il cortisonico qui induce un effetto antinfiammatorio massivo sulle radici sofferenti causando indirettamente la riduzione del materiale erniale per atrofia.

INFILTRAZIONE PERIDURALE

Paziente di anni 49

Sesso femminile

Presenta lombo-sciatalgia destra

Risonanza Magnetica

PROCEDURA INFILTRAZIONE

Posizionamento ago

PROCEDURA INFILTRAZIONE

PROCEDURA INFILTRAZIONE

INFILTRAZIONE PERIDURALE

altro accesso

Paziente di anni 63

Sesso femminile

Forte sciatalgia sinistra

INFILTRAZIONE PERIDURALE altro accesso

INFILTRAZIONE PERIDURALE altro accesso

INFILTRAZIONE PERIDURALE

altro accesso

Paziente di anni 67

Sesso femminile

Lombalgia acuta con dolore gluteo sx

Risonanza Magnetica

Luglio 2012

PROCEDURA INFILTRAZIONE

Posizionamento ago

PROCEDURA INFILTRAZIONE

Risonanza Magnetica

Settembre 2012

INFILTRAZIONE RADICOLARE

Paziente di anni 31

Sesso maschile

Operato E.D. L5-S1 nell'agosto 2011.

Dopo 4 mesi di nuovo forte sciatalgia dx.

Risonanza Magnetica

T.C.

PROCEDURA INFILTRAZIONE

Posizionamento ago

PROCEDURA INFILTRAZIONE

PROCEDURA INFILTRAZIONE

INFILTRAZIONE RACHIDE CERVICALE

Paziente di anni 73

Sesso maschile

Presenta forte cervicobrachialgia sinistra

Risonanza magnetica

T.C.

PROCEDURA INFILTRAZIONE

Posizionamento ago

PROCEDURA INFILTRAZIONE

INFILTRAZIONE FACCETTE ARTICOLARI

Paziente di anni 81

Sesso femminile

Presenta dolore costante al passaggio lombo-
sacrale prevalente verso sinistra

INFILTRAZIONE FACCETTE ARTICOLARI

COMPLICAZIONE INFILTRAZIONE

1° controllo TC ago

2° controllo TC ago

COMPLICAZIONE INFILTRAZIONE

3° controllo TC ago

4° controllo TC ago

COMPLICAZIONE INFILTRAZIONE

Iniezione farmaco

COMPLICAZIONE INFILTRAZIONE

La breccia rimane aperta per circa 2 giorni

BLOCCO DELLA RADICE NERVOSA:

E' una procedura invasiva a scopo diagnostico della Radiologia Interventistica che serve a valutare in modo preciso la causa d'origine del dolore riferito dal paziente.

BLOCCO DELLA RADICE NERVOSA

Paziente di anni 30

Sesso maschile

Presenta forte dolore costante sottoscrotale

BLOCCO DELLA RADICE NERVOSA

VERTEBROPLASTICA:

E' una tecnica di Radiologia Interventistica che consiste nell'iniettare per via percutanea del cemento (acrilico) in una vertebra patologica

INDICAZIONI VERTEBROPLASTICA:

- FRATTURA VERTEBRALE DA TRAUMA
- FRATTURA VERTEBRALE DA INSUFFICIENZA

INDISPENSABILE!

Prima di ogni trattamento che non si riferisca a lesioni traumatiche in soggetti giovani, è necessario avere una diagnosi certa tramite biopsia ossea

CONTROINDICAZIONI:

- OSTEOMIELITE
- SPONDILODISCITE
- FRATTURA O INTERRUZIONE DELLA LIMITANTE POSTERIORE DELLA VERTEBRA
- ALLERGIA AI COMPONENTI UTILIZZATI

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

- Anamnesi con storia clinica dettagliata
- Terapie pregresse
- Radiografia del rachide nella proiezioni A.P e L.L

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

- La Risonanza Magnetica consente in più di evidenziare le vertebre che presentano edema intraspongioso a testimonianza che le fratture siano più o meno recenti

T2 STIR

T2

DESCRIZIONE PROCEDURA
DI
VERTEBROPLASTICA
(con accesso bilaterale)

Valutazione TC lesione vertebrale

Centratura TC guidata

Campo sterile e materiali

Anestesia locale

Accesso con ago biopsia

ControlloTC

ControlloTC

Doppio accesso con ago biopsia

VerificaTC

Cemento (acrílico)

Introduzione cemento

Verifica finale TC

Verifica finale TC

OZONOTERAPIA:

Grazie per
l'attenzione!